

MONOGRAFÍA FARMACOLÓGICA

LOMBRIZOLE® 100 mg TABLETAS

Mebendazol

CLASIFICACIÓN TERAPEÚTICA CÓDIGO ATC

P Antiparasitarios, insecticidas y repelentes
P02 Antihelmínticos
P02C Agentes antinematodos
P02CA Derivados de benzimidazol
P02CA01 Mebendazol

INFORMACIÓN FARMACOLÓGICA

Antihelmíntico de amplio espectro

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Mebendazol..... 100 mg

Excipientes c.s.p..... 1 tableta

INDICACIONES TERAPÉUTICAS:

Indicado para Tricocéfalos, Oxiuros, Lombrices, Tenias, *Áscaris*, *Uncinarias*, *Anquilostoma duodenale* y otros parásitos comunes de infestación, así como en infestaciones mixtas.

MECANISMO DE ACCIÓN O FARMACODINAMIA:

Posee una acción helminticida, larvicida y ovicida. Causa degeneración de los microtúbulos citoplasmáticos de los microorganismos para sobrevivir y reproducirse, se reducen los niveles de energía hasta la muerte del parásito.

FARMACOCINÉTICA:

Levemente absorbido por el tracto gastrointestinal, su absorción aumenta cuando se administra con los alimentos. Se distribuye por el organismo y es metabolizado en el hígado. Se elimina por las heces y por la orina.

CONTRAINDICACIONES:

Hipersensibilidad al medicamento. Mujeres embarazadas. Niños menores de 2 años (riesgo de convulsión)

ADVERTENCIAS:

Evitar en tratamiento concomitante con metronidazol riesgo de síndrome Stevens Johnson / necrólisis epidérmica tóxica.

REACCIONES SECUNDARIAS:

Dolor abdominal, diarrea transitoria en casos de mucha infección o eliminación de lombrices.
Hipersensibilidad: rash, urticaria, angioedema.

INTERACCIONES MEDICAMENTOSAS Y DE OTRO GÉNERO:

La cimetidina puede inhibir el metabolismo del mebendazol en el hígado aumentando la concentración en plasma esto ocurre mucho en tratamientos prolongados.

PRECAUCIONES:

Generales: Enfermedad hepática

VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral

DOSIS:

Dosis fijas e idénticas para niños y adultos

Tricocefalosis, Ascariasis, Uncinarias y Uxiriasis: una tableta, 2 veces al día durante 3 días consecutivos. Pudiendo repetir la dosis a las 2 o 3 semanas.

Hymenalepiasis y otras Cestoidiasis: dos tabletas, dos veces al día durante 3 días consecutivos.

Enterobiasis: una dosis, repetir a las 2 o 3 semanas.

El medicamento debe ser ingerido después del primer y último alimento.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:

Almacenar a una temperatura no mayor a 30°C.

Venta bajo prescripción Médica.

Manténgase fuera del alcance de los niños.

PRESENTACIÓN:

Carterita con 6 tabletas en blíster.

DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL DE ENVASE Y EMPAQUE:

Blíster (Al/PVC/PVDC) en caja de cartón con barniz UV.

FORMA FARMACÉUTICA:

Tableta redonda de caras convexas, de 9 mm color beige.

Bibliografía:

1.- Drug Information for the Health Care Professional. Volumen 1. Edición 22, 2002. pp. 1965-68.